



DỊCH HẠI TRÊN CÂY XOÀI



BỘ TRĨ

1 mm

Loài côn trùng có kích thước nhỏ, nhanh nhẹn này dù có vai trò trong việc thụ phấn hoa nhưng một khi xuất hiện ở mật số cao, sự phá hại của chúng dẫn đến hiện tượng chùm hoa bị khô, bộ phận bị hại sần sùi, hóa bần và quả non (< 4 cm) cuối cùng bị rụng sớm



BỘ XÍT MUỖI

4 - 7 mm

Bộ xít muỗi chích hút ăn phá bộ phận non bao gồm chùm hoa, chồi, lá non và quả non. Vết chích bị thâm đen, co cụm, biến dạng và bị héo khô sau đó. Khi mật số cao, có thể gây thiệt hại hoàn toàn một mùa hoa trong vòng vài ngày.



RỆP SÁP

7 mm

Con non được bảo vệ trong túi trứng (ovisac) do con cái tạo ra, sau đó phân tán trong tán lá. Rệp sáp chích hút nhựa của cây. Trong trường hợp mật số quần thể cao, chất thải của chúng có chứa nhiều mật tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển. Khi bị gây hại nặng, cây bị suy yếu và rụng lá.



RUỒI ĐỤC QUẢ

10 mm

Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc xuyên qua vỏ quả để đẻ trứng. Sau khi nở, ấu trùng ăn phá thịt quả, làm thối. Ấu trùng sau đó búng mình rơi xuống đất, chui vào đất để tạo nhộng. Nhộng vũ hóa thành ruồi trưởng thành.

